

POUŽITIE V ZÁHRADÁCH A PREDZÁHRADKÁCH JE POVOLENÉ  
Prípravok na ochranu rastlín pre neprofesionálnych používateľov

## GONDOLA®

GONDOLA je postrekový insekticíd vo forme kvapalného suspenzného koncentráту pre riedenie vodou (SC), určený na ničenie vošiek a molíc v okrasných rastlinách.

### ÚČINNÁ LÁTKA

**Sulfoxaflor** 120 g/l  
(11,3 % hm)

Látky nebezpečné pre zdravie, ktoré prispievajú ku klasifikácii prípravku: sulfoxaflor CAS No.: 946578-00-3, propane-1,2-diol CAS No.: 57-55-6

### OZNAČENIE PRÍPRAVKU



GHS09

### Pozor

- H411** **Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.**
- P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.
- P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.
- P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.
- P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
- P391 Zozbierajte uniknutý produkt.
- P501 Nepoužitý prípravok v pôvodnom obale a prázdne obaly z prípravku zneškodnite ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným, alebo mestským úradom alebo odovzdajte v mieste zberu domového odpadu, špeciálne vytvoreného pre tento účel (v rámci triedenia odpadov) príslušnou samosprávou (informujte sa u orgánu miestnej správy).
- EUH208** **Obsahuje 1,2 benzisothiazolin-3-one. Môže vyvolať alergickú reakciu.**
- EUH401** **Dodržiavajte návod na používanie, aby ste zabránili vzniku rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie.**
- SP1** **Neznečisťujte vodu prípravkom alebo jeho obalom (Nečistite aplikačné zariadenie v blízkosti povrchových vôd.).**
- Spe3** **Z dôvodu ochrany vodných organizmov udržiavajte medzi ošetrovanou plochu a povrchovými vodnými plochami ochranný pás zeme v dĺžke 5m.**
- Spe8** **Nebezpečný pre včely. Z dôvodu ochrany včiel a iného opel'ujúceho hmyzu aplikujte maximálne do BBCH 59 alebo najneskôr 6 dní pred kvitnutím, v bezletovom čase včiel. Nepoužívajte prípravok, ak sú v ošetrovanom poraste prítomné kvitnúce buriny. Pred aplikáciou je nutné zabezpečiť likvidáciu kvitnúcich burín v ošetrovanom poraste vhodnými herbicídnyimi prípravkami (za kvitnúci porast sa považuje, ak sa v ňom na 1 m<sup>2</sup> nachádzajú najmenej 2 kvitnúce rastliny/buriny).**

Aplikujte v bezveternom počasí; zabezpečte, aby nedošlo k úletu aplikovanej kvapaliny na necieľový kvitnúci porast. Neaplikujte v blízkosti kvitnúcich burín. Okraje polí nesmú byť kontaminované postrekom prípravku.

- Z3** Pre domáce, hospodárske a voľne žijúce zvieratá nebezpečný.  
**Vt5** Riziko vyplývajúce z použitia prípravku pri dodržaní predpísanej dávky alebo koncentrácie je pre vtáky prijateľné.  
**Vo2** Pre ryby a ostatné vodné organizmy jedovatý.  
**V3** Riziko prípravku je prijateľné pre dážďovky a iné pôdne makroorganizmy.  
**Vč2** Prípravok pre včely škodlivý.

Prípravok je pre populácie necieľových článkonožcov jedovatý.

Po aplikácii prípravku v skleníkoch počkajte po dobu 10 týždňov s použitím necieľových článkonožcov ako biologickej ochrany z dôvodu vysokého rizika ich poškodenia.

Ak sa v skleníku nachádzajú úliky s čmeliakmi - opel'ovačmi, je potrebné ich pred aplikáciou prípravku vybrať. Prípravok aplikujte najneskôr 6 dní pred kvitnutím. Úliky opätovne vložte naspäť najskôr 6 dní po uschnutí postreku na ošetrovaných rastlinách.

**Zákaz používania prípravku v 1. ochrannom pásme zdrojov pitných vôd!**

Nepoužívajte prípravok v blízkosti vodárenských tokov, studní, studničiek a prameňov využívaných pre individuálne zásobovanie alebo občasné využitie na pitné účely!

**Dodržiavajte vzdialenosť minimálne 10 m.**

**Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!**

**Zákaz vylievania prípravku a zvyškov postrekovej kvapaliny do verejnej kanalizácie.**

**Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu!**

**Uložte mimo dosahu zvierat!**

**Pred použitím si pozorne prečítajte priložený návod na použitie!**

**Držiteľ autorizácie:** FLORASERVIS spol. s r.o.  
Široká 10487/30, 831 07 Bratislava  
Slovenská republika

**Číslo autorizácie ÚKSÚP:** 20-00925-MB

**Dátum výroby:** uvedené na obale  
**Číslo výrobnej šarže:** uvedené na obale

**Balenie:** 2 ml, 10 ml, 20 ml, 50 ml PET alebo HDPE fľaša

GONDOLA<sup>®</sup> je ochranná známka spoločnosti Corteva Agriscience  
Informačná služba firmy Corteva Agriscience +0421- 2-5443 5863

## **PÔSOBENIE PRÍPRAVKU**

GONDOLA je kontaktný a systémový insekticíd s translaminárnym účinkom. Účinná látka sulfoxaflor sa do tela škodlivého hmyzu dostáva kontaktom a cicaním štiav. Pôsobí ako neurotoxín, zabraňuje prenosu impulzov v nervovom systéme škodlivého hmyzu. Účinok sa prejavuje do niekoľkých hodín po intoxikácii škodlivého hmyzu s následným úhynom. Doba účinku prípravku je 14-21 dní v závislosti od infekčného tlaku, poveternostných podmienok, teploty a pod.

**NÁVOD NA POUŽITIE**

Plodina	Účel použitia	Dávka/100 m <sup>2</sup>	Ochranná doba	Poznámka
okrasné rastliny	voška maková, voška broskyňová molica skleníková, molica tabaková	2 ml	7 dní	max. 2x za vegetáciu  iba trvalý skleník

Ochranná doba v dňoch vyjadruje počet dní od aplikácie prípravku, počas ktorých je z hľadiska bezpečnosti zakázané zberať plodinu, skrmovať alebo akokoľvek s ňou manipulovať.

**POKYNY PRE APLIKÁCIU**

**Okrasné rastliny** v trvalých skleníkoch ošetríte proti voškám prípravkom GONDOLA v dávke 2 ml/100 m<sup>2</sup> na začiatku liahnutia lariev alebo po zistení ich výskytu, v rastovej fáze od vyvinutých 2. listov do začiatku kvitnutia (BBCH 12-59). V prípade potreby postrek zopakujte po 7 dňoch.

Proti moliciam ošetríte dávkou 2 ml/100 m<sup>2</sup>, od vyvinutých 2. listov do začiatku kvitnutia (BBCH 12-59). V prípade pretrvávajúceho výskytu molice zopakujte postrek po 7-14 dňoch.

Maximálny počet aplikácií za sezónu: 2x. Maximálna ročná dávka prípravku je 4 ml/100 m<sup>2</sup>.

Dávka vody 2-20 l/100 m<sup>2</sup>.

**Neaplikujte neskôr ako 6 dní pred kvitnutím a počas kvitnutia!**

**INFORMÁCIE O MOŽNEJ FYTOTOXICITE, ODRODOVEJ CITLIVOSTI A VŠETKÝCH PRIAMÝCH A NEPRIAMÝCH NEPRIAZNIVÝCH ÚČINKOCH NA RASTLINY ALEBO RASTLINNÉ PRODUKTY**

Pri dodržaní dávkovania a všetkých pokynov, ktoré sú uvedené na etikete pre aplikáciu prípravku GONDOLA, nie sú známe fytotoxické účinky, negatívne vplyvy na odrody, rastliny (vrátane produktov množenia) alebo rastlinné produkty.

**OPATRENIA PROTI VZNIKU REZISTENCIE**

Prípravok GONDOLA obsahuje účinnú látku sulfoxaflor, ktorá patrí do skupiny sulfoximínov (IRAC CODE: 4C). Na území SR nebola doposiaľ zaznamenaná rezistencia (odolnosť škodcu) na účinnú látku. Proti vzniku rezistencie dodržujte najmä nasledujúce opatrenia:

- Nepoužívajte nižšiu dávku prípravku než je autorizovaná
- Počas vegetácie používajte aj insekticídy s iným mechanizmom a spôsobom účinku a z rozličných chemických skupín
- Neprekračujte maximálnu povolenú ročnú dávku 0,4 l/ha.

**VPLYV NA ÚRODU**

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na úrodu.

**VPLYV NA NÁSLEDNÉ, NÁHRADNÉ A SUSEDIACE PLODINY**

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nemá aplikácia prípravku negatívny vplyv na následné, náhradné a susediace plodiny.

**VPLYV NA UŽITOČNÉ A INÉ NECIEĽOVÉ ORGANIZMY**

Pre povolený rozsah a spôsob použitia prípravku nie sú známe údaje o vplyve na užitočné a iné necieľové organizmy.

**Neošetríte kvitnúce porasty! Pred ošetrením sa uistite, že v porastoch sa nenachádzajú kvitnúce buriny lákajúce užitočný hmyz, hlavne včely a čmeliaky!**

**PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY**

Odmerané množstvo prípravku vlejte do nádrže postrekovača naplnenej do polovice vodou a za stáleho miešania doplňte na požadovaný objem. Po uzavretí postrekovača pretrepte postrekovač tak, aby sa postreková kvapalina premiešala. Pripravte len také množstvo postrekovej kvapaliny, ktoré spotrebujete. **Zákaz opätovného použitia obalu a jeho použitia na iné účely!**

### **ČISTENIE APLIKAČNÉHO ZARIADENIA**

Po skončení aplikácie prípravku je potrebné vyprázdniť nádrž postrekovacieho zariadenia a celé zariadenie vypláchnuť čistou vodou. Zvyšky aplikačnej kvapaliny je zakázané vylievať v blízkosti vodných zdrojov, podzemných vôd a recipientov povrchových vôd.

### **BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA**

Pred použitím prípravku si dôkladne prečítajte návod na použitie (etiketu prípravku).

#### Príprava postreku:

Pri príprave postrekovej kvapaliny je nutné používať ochranný pracovný odev odolný voči chemikáliám, gumovú/PVC zásteru, rukavice odolné voči chemikáliám, ochranný štít na tvár resp. ochranné okuliare, respirátor na ochranu dýchacích orgánov a gumovú pracovnú obuv.

#### Aplikácia:

Pri aplikácii postreku používať ochranný pracovný odev, gumené rukavice a gumovú pracovnú obuv. Pri ošetrovaní vysokých plodín, kedy rozprašovanie smeruje do výšky hlavy, použite tiež čiapku alebo klobúk. Poškodené ochranné prostriedky hneď vymeňte. Osobné ochranné prostriedky ako sú rukavice, odevy a obuv, pokiaľ nie sú jednorazové, po použití vyperte a očistite. Po ukončení práce opustite ošetrované miesta.

#### Ďalšie odporúčania pre bezpečné zaobchádzanie s prípravkom:

Pri príprave postreku ani pri aplikácii nepoužívajte kontaktné šošovky. Počas práce a po nej, až do vyzlečenia pracovného obleku a umytia tváre a rúk teplou vodou a mydlom, nejedzte, nepite a nefajčite.

Práca s prípravkom je nevhodná pre alergikov, tehotné a dojčiace ženy a pre mladistvých.

### **VŠEOBECNÉ OPATRENIA NA PREDCHÁDZANIE ZDRAVOTNÉHO RIZIKA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM PRÍPRAVKOV NA OCHRANU RASTLÍN V ZÁHRADÁCH A V OBYTNÝCH ZÓNACH:**

- neprofesionálny používateľ je povinný zaobchádzať s prípravkom bezpečne v súlade s postupom uvedeným na etikete,
- používať predpísané osobné ochranné prostriedky a dodržiavať opatrenia na predchádzanie rizika ohrozenia zdravia iných osôb,
- zabrániť priamemu kontaktu postreku s inými osobami - min. vzdialenosť iných osôb od postrekovania je 2 m pri postreku nízkych porastov a 5 m pri postreku vysokých porastov,
- zabrániť úletu postreku na susedné pozemky a zamedziť kontaminácii necieľových porastov, trávnikov a iných plôch, najmä s ohľadom na expozíciu rizikových skupín ako sú deti, tehotné a dojčiace ženy, starí a chorí ľudia,
- trvanie práce s postrekom nesmie presiahnuť pol hodinu počas jedného dňa,
- do ošetrovaných porastov vstupovať najskôr na druhý deň po aplikácii postreku.

#### Obmedzenia s cieľom chrániť zdravie miestnych obyvateľov a náhodne sa vyskytujúcich okolostojacich osôb:

Vzdialenosť medzi hranicou ošetroanej plochy od hranice oblasti využívanej zraniteľnými skupinami

obyvateľstva nesmie byť menšia ako 5 metrov.

Prípravok je povolené aplikovať iba v rámci súkromných záhrad a pozemkov!

## **PRVÁ POMOC**

**Nikdy nepodávajte tekutiny a nevyvolávajte zvracanie, ak je pacient v bezvedomí alebo má kŕče.**

**Po nadýchaní:** Opustite zamorený priestor, zabezpečte pobyt na čistom vzduchu, rozopnite na hrudníku odev, zabezpečte pokoj a teplo. Ak osoba nedýcha, zavolajte RZP a poskytnite umelé dýchanie; pri dýchaní z úst do úst použite ochranný prostriedok (rúšku a pod.). Zavolajte lekára.

**Po požití:** Nevyvolávajte zvracanie. Ak je pacient pri vedomí, vypláchnite mu ústa vodou a nechajte ho vypíť veľké množstvo vody. Poradte sa s lekárom. O vyvolaní/nevyvolaní zvracania musí rozhodnúť lekár.

**Po zasiahnutí očí:** Oči okamžite oplachujte vodou. Ak máte kontaktné šošovky - po 5 minútach ich vyberte a ešte aspoň 15 minút pokračujte vo vyplachovaní očí. Bez odkladu sa poradte s lekárom, podľa možnosti s oftalmológom.

**Po zasiahnutí pokožky:** Odstráňte zamorený odev a postihnuté miesto dôkladne umyte teplou vodou a mydlom aspoň 15 minút. Zasiahnutý odev pred opätovným použitím vyperte. Odev alebo časti odevu, ktoré sa nedajú odmoriť je potrebné zlikvidovať. Pri pretrvávajúcom podráždení vyhľadajte lekára.

**Správa pre lekára:** Podporná liečba. Nie je známy žiadny špecifický protijed. Liečba je založená na posudku lekára, ktorý vychádza zo symptómov pacienta. Pri otrave alebo podozrení na otravu privolajte lekára a informujte ho o prípravku a poskytnutej prvej pomoci. V prípade potreby lekár môže liečbu konzultovať s Národným toxikologickým informačným centrom v Bratislave; tel.č.: +421-2-54 77 41 66.

## **SKLADOVANIE**

Prípravok GONDOLA skladujte v pôvodných neporušených obaloch, v suchých, chladných, dobre vetrateľných, hygienicky čistých a uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov, krmív, hnojív, liekov, dezinfekčných prostriedkov a prázdnych obalov pri teplotách +5°C až +25°C. Chráňte pred mrazom, ohňom a priamym slnečným svetlom. Doba skladovateľnosti v originálnych neporušených obaloch je 2 roky od dátumu výroby. Výrobca neručí za škody vzniknuté nevhodným skladovaním alebo nevhodným použitím prípravku.

## **ZNEŠKODNENIE OBALOV A ZVYŠKOV**

Nepoužitú zvyšku prípravku v pôvodnom obale, prázdne obaly (3× vypláchnuté vodou) a vrchný obal (škatuľku) zneškodnite ako nebezpečný odpad uložením do vyhradených kontajnerov určených na tento účel obecným, alebo mestským úradom. **Obaly od prípravku sa nesmú znovu používať na akékoľvek iné účely!**

Oplachové vody použite na prípravu postrekovej kvapaliny. Zvyšky postrekovej kvapaliny po zriedení vystriekajte na ošetrovanom pozemku, nesmú však zasiahnuť zdroje podzemných ani recipienty povrchových vôd.

Použitú náradie, nástroje, zariadenia a ochranné pomôcky asanujte 3% roztokom uhličitanu sodného (sódy) a opláchnite vodou.